

表：世田谷区带状疱疹予防接種費用助成一覧

満50歳以上 対象世田谷区住所登録	生ワクチン弱毒生水痘ワクチン	不活化ワクチン組み換え带状疱疹ワクチン
	ビケン	シングリックス
回数	1回 皮下注射	2回 筋肉内注射 2回目は2か月後 6か月後までに接種を行う
助成券補助額 生涯に一度限り	4000円	10000円 X 2
当院のワクチン費用	7700円	22000円 X 2
予防接種不相当者はどのワクチンも接種禁止	妊娠禁忌 接種後2か月は避妊 免疫抑制剤使用中は接種禁止 その他腫瘍免疫不全状態 リウマチ膠原病の治療薬など	左記の人も接種できる 主治医の判断が必要
発症予防効果	50-59歳 69.8% 60-69歳 64% 70歳-79歳 41% 80歳以上 18%	50-59歳 96.8% 60-69歳97.4% 70-79歳 91.3% 80歳以上 91.4%
副反応	注射部位の熱感、疼痛、発赤 10-40%	注射部位疼痛 50%以上 筋肉痛 頭痛 30%以上 発赤25%以上 熱感10%
効果持続期間	5年程度	9年以上とされている

注意点：ワクチンの接種不相当者

- 明らかな発熱 37.5℃以上
- 重篤な急性疾患にかかっている者
- 本剤の成分にアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
- 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有するもの及び免疫抑制をきたす治療を受けている
- 妊娠していることが明らかな者（妊娠の可能性が完全に排除できることが重要）
- 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

医師が認めた場合には、複数ワクチンの同時接種が可能である。

不活化ワクチン シングリックスを使用する場合には、副反応が起こる割合が高く、単独で接種することが好ましいと判断する。

注意事項

- 新型コロナワクチンの接種前後2週間はほかのワクチン接種は避ける
- 生ワクチン同士を別の日に接種する場合には、中27日以上の間隔をあける必要がある。
- 生ワクチン接種の場合女性では、妊娠していないこと、妊娠している可能性がないことを確認し、**接種後2か月間は避妊すること**が必要ある。